



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

Exmo (a). Senhor (a)

Nota nº 21241 / 0.36 / DNSP/2019

Maputo 04/12 / 2019

Assunto: Revisão da Linha de Tratamento da Tuberculose Resistente à Medicamentos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou recentemente novas recomendações para o tratamento da TB - MR/RR orientando o uso de regimes preferencialmente sem injectáveis. De acordo com o despacho nº 559/2102/2019 datado de 10/04/2019, da Sua Excia. Sra. Ministra da Saúde, foi autorizada a introdução de Regime Oral para o Tratamento da Tuberculose Resistente. Assim sendo, a Kanamicina e a Capreomicina não são mais recomendados para uso no tratamento de pacientes com TB MR/RR excepto em condições especiais.

É neste contexto que, o Ministério da Saúde recomenda o seguinte:

1. Suspensão do uso de injectáveis para o tratamento da TB MR/RR;
2. Implementação de regimes orais em todos pacientes em com TB MR/RR, de acordo com a tabela abaixo;
3. Implementação de DOT-Comunitário para os pacientes com TB MR/RR de acordo com as normas do PNCT;
4. Todas essas recomendações devem ser levadas a cabo a partir de 15 de Dezembro de 2019.

ENDEREÇO:
MINISTÉRIO DA SAÚDE
C. POSTAL
Av. Eduardo Mondlane/Salvador Allende
MAPUTO – MOÇAMBIQUE

MS – DR 4 – Formato A4 (210x297 mm) C.I.

Telefones: 21-326164; 21

Telex: 6-239 MISAU MO

FAX: 258 (21) 326164

EXT 139, 325, 127:229

Orientações para o tratamento de TB MR/RR usando o regime padronizado oral

Cenário	Ação	Regime
Novo paciente com TB RR/MR	Iniciar tratamento com regime totalmente oral.	<p>a) Adultos e Crianças ≥ 6 anos e > 15kg: 4 a 6 Bdq-Lzd-Lfx-Cfz-Cs / 14 Bdq-Lfx-Cfz-Cs</p> <p>b) Crianças de 3-6 anos: 4 a 6 Dlm-Lzd-Lfx-Cfz-Cs / 14 Dlm-Lfx-Cfz-Cs</p> <p>c) Crianças abaixo de 3 anos de idade: regime individualizado</p>
Pacientes com TB-MR/RR > 15 anos na fase de manutenção com regime padronizado curto ou longo.	Continuar tratamento com o regime em uso até completar o tempo de tratamento.	<p>Fase de manutenção do regime longo: 12 Mfx-Cs-Pto-E-Z</p> <p>Fase de manutenção do regime curto: 5 Mfx-Cfz-Z-E</p>
Pacientes com TB-MR/RR > 15 anos na fase intensiva com regime padronizado curto.	<p>Substituir o injectável por Bedaquilina até o fim do tratamento.</p> <p>NOTA: A duração total do tratamento é de 9 à 11 meses.</p>	<p>Para completar a fase intensiva: Bdq-Mfx-Pto-Cfz-Z-H(alta doses)-E</p> <p>Fase de Manutenção: 5 Bdq-Mfx-Cfz-Z-E</p>
Pacientes com TB-MR/RR > 15 anos na fase intensiva com regime padronizado longo com injectáveis.	<p>Substituir para o novo regime oral.</p> <p>NOTA: No novo regime oral, Linzolide deve ser administrado por 4-6 meses, e a duração total do tratamento deve ser 18-20 meses.</p>	<p>Para completar a fase intensiva: Bdq-Lzd-Lfx-Cfz-Cs</p> <p>Fase de manutenção: 14 Bdq-Lfx-Cfz-Cs</p>

ENDEREÇO:
 MINISTÉRIO DA SAÚDE
 C. POSTAL
 Av. Eduardo Mondlane/Salvador Allende
 MAPUTO – MOÇAMBIQUE

Telefones: 21-326164; 21

Telex: 6-239 MISAU MO

FAX: 258 (21) 326164

EXT 139, 325, 127:229

Crianças (0-15 anos) com TB-MR/RR na fase intensiva com regime padronizado curto ou longo com injectáveis.	Fazer um resumo do caso e enviar ao comité terapêutico de TB para orientações do regime.	N/A
Crianças (0-15 anos) com TB-MR/RR na fase de manutenção com regime padronizado curto ou longo sem injectáveis.	Continuar tratamento até completar o tempo de tratamento.	N/A

Regime de tratamento individualizado para TB resistente em Moçambique

Este regime deve ser desenhado sob orientação do Comité Terapêutico de TB. Serão elegíveis ao regime individualizado todos os pacientes listados abaixo:

- As crianças com TB resistentes menores de 3 anos;
- Todos adultos com qualquer outra contra-indicação ao regime padronizado, por exemplo TB Pré-XR e XR, pacientes com reacções adversas e pacientes com alterações laboratoriais ou condições clínicas que contraindicam o uso de algum medicamento do regime padronizado;
- Ter anemia (Hgb <8g/dl), Neutrófilos <750 cel/mm³ e/ou Plaquetas <50.000 cel/mm³.

Nota: para enviar os casos clínicos ao comite devem usar o seguinte e-mail: comite.nacional.tbmr@gmail.com

A Directora Nacional

Dra. Rosa Marlene Manjate Cuco
(MD.MPH Especialista em Saúde Pública Consultora)

ENDEREÇO:
MINISTÉRIO DA SAÚDE
C. POSTAL
Av. Eduardo Mondlane/Salvador Allende
MAPUTO – MOÇAMBIQUE

MS – DR 4 – Formato A4 (210x297 mm) C.I.

Telefones: 21-326164; 21
Telex: 6-239 MISAU MO
FAX: 258 (21) 326164
EXT 139, 325, 127;229